



た状態が続くと骨が溶けていくと言われましたが、薬は処方していただいただけませんでした。歯の根の破折は、分かりにくいものなのでしょうか。

(長崎市、43歳女性)

からず、歯根破折に特有の症状、例えば①歯肉が腫れる②歯肉におできのようなフィステル(うみの出口)ができる③かみ合わせると痛いなどが出ないことも多いのです。

したのであれば、その時点で抜歯という治療を選択することが望ましいと思われます。現在痛みも腫れもないということを決心しにくいかもしれませんが、ちゅうちょしている間

続けると、耐性菌が発生し、より重篤な感染症になる可能性があります。よって、そのような状態での抗菌薬の長期の投与は望ましくありません。

抜歯後の治療もさまざまな方法がありますので、説明を十分に受け、納得して抜歯してもらうことが大切です。どうしても抜歯に納得がいけない場合は、他の医療機関でセカンドオピニオンを受けるのもよいかと思えます。

また、歯根破折した歯を残したまま抗菌薬を服用し

### 歯の根が破折？

## 明確なら早期に抜歯を

【問い】2年前に歯の根の先が感染症になり治療を受けましたが、完治していません。最近になって歯肉を押すと痛みが出るようになりました。痛みや腫れはありません。治療した歯科を受診したところ歯の根が破折していると言われ、抜歯を勧められましたが、すぐに抜く決心もつきません。このまま感染し

【答え】治療の経過と症状から、2年前に歯根の治療を始めた時点で歯根破折は始まっていたのかもしれない。

ですが、小さなヒビのような初期の段階では歯根破折はエックス線写真でも分

1、2年経過し、症状がはっきり出てきて、歯根破折と後から診断されること

はよくあることです。もし歯根破折がはっきり

また、歯根破折した歯を残したまま抗菌薬を服用し

### 質問をどうぞ

歯と口の健康に関する質問を受け付けます。県歯科医師会の先生方が回答します(直接本人に回答はしません)。症状などを分かりやすくまとめ、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記し、〒852-8601、長崎市茂里町3の1、長崎新聞社生活文化部「お口の相談室」係に送ってください。県歯科医師会のホームページは「8020ながさき」で検索できますので参考にしてください。